

2.2. Vệ sinh làm sạch

- ❖ Vệ sinh hàng ngày trong, ngoài chuồng nuôi, quét dọn, thu gom rác và chất thải. Rửa sạch chuồng trại, dụng cụ, bảo hộ lao động bằng nước với xà phòng hoặc chất tẩy rửa.
 - ❖ Định kỳ 1 lần/tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi.

2.3. Sát trùng

- Sát trùng trong, ngoài chuồng nuôi, các thiết bị dụng cụ, bảo hộ lao động trước khi đưa vào trại và sau khi sử dụng.
 - Sát trùng người và phương tiện vận chuyển,...



Phun sát trùng trong và ngoài chuồng nuôi



*Phun sát trùng xe máy, ô tô
trước và sau khi vào khu chăn nuô*

- Xử lý phân và chất thải bằng biogas, chôn, đốt



Đốt chất thải

Chôn chất thải

- Tiêu hủy xác lợn chết và sản phẩm từ lợn theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y.

BIỆN PHÁP CHỐNG BỆNH

3.1. Thực hiện an toàn sinh học và “5 KHÔNG”

- **Không** giấu dịch (thông báo với chính quyền và cơ quan chuyên môn khi phát hiện lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi).
 - **Không** mua, bán lợn bệnh, lợn chết.
 - **Không** giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết.
 - **Không** vứt lợn chết ra môi trường xung quanh.
 - **Không** sử dụng thức ăn thừa chưa qua nấu chín làm thức ăn cho lợn.

3.2. Giám sát và cảnh báo dịch bệnh

Người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo cơ quan thú y, chính quyền địa phương.

3.3. Tiêu hủy lớn khi có dịch xảy ra

- Khi có dịch bệnh xảy ra, phải chấp hành tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương.
 - Mức hỗ trợ căn cứ:
 - Theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
 - Hoặc theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ:
 - Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm ở địa phương có dịch bệnh xảy ra.
 - Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 đến 2,0 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh.




Tiêu hủy lớn mắc bệnh



TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ CÁC BIÊN PHÁP PHÒNG CHỐNG



Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (024). 3 771 1161 - Fax: (024). 3 726 2487

Website: www.khuyennongvn.gov.vn

I | ĐẶC ĐIỂM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

1.1. Đặc điểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

- ✓ Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút gây ra, khi lợn bị bệnh có tỷ lệ chết cao và có thể lên đến 100%. Hiện nay **chưa có vắc-xin phòng, không có thuốc điều trị.**
- ✓ Vi-rút Dịch tả lợn Châu Phi có trong máu, cơ quan nội tạng, dịch bài tiết của lợn nhiễm bệnh. Vi-rút trong máu lợn khi ở nhiệt độ 4°C có thể tồn tại trong 18 tháng. Lợn sau khi khỏi bệnh sẽ ở thể mãn tính có thể mang vi-rút suốt đời.
- ✓ Vi-rút bị tiêu diệt ở nhiệt độ 56°C trong 70 phút hoặc ở 60°C trong 20 phút.
- ✓ Vi-rút mãn cảm với hầu hết các hóa chất và thuốc sát trùng thông thường như vôi, Iodine, Chloroform, Virkon® S,... và xà phòng.
- ✓ Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi **không gây bệnh cho người và các động vật khác.**

1.2. Đường truyền lây bệnh

- Bệnh lây trực tiếp từ lợn ốm sang lợn khỏe.
- Bệnh lây gián tiếp do tiếp xúc với người, động vật, phương tiện, dụng cụ, thức ăn, nước uống, môi trường có mầm bệnh.



1.3. Triệu chứng bệnh

- ★ **Lợn sốt cao: 40,5 - 42°C.**
- ★ **Lợn bỏ ăn, lười vận động.**
- ★ **Da tai, cẳng chân, phần dưới ngực và bụng đỏ sau đó xanh tím.**
- ★ **Tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón.**



Da lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: đỏ, xanh tím

II | BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH

THỰC HIỆN AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI GỒM:

2.1. Cách ly, kiểm soát ra, vào cơ sở chăn nuôi

- ✿ Chăn nuôi cùng vào - cùng ra.
- ✿ Kiểm soát con giống: con giống phải sạch bệnh, giống mới mua phải nuôi cách ly ít nhất 2 tuần ở chuồng, khu cách ly.
- ✿ Thực hiện cách ly khu vực chuồng nuôi với nơi ở của người và động vật khác bằng hàng rào, vách ngăn xung quanh, cửa ra vào có khóa, bố trí hố hoặc khay sát trùng trước cửa ra vào chuồng.
- ✿ Không nuôi các động vật khác như lợn rừng, gà, vịt, chó, mèo,... trong khu vực nuôi lợn.



Khu chăn nuôi biệt lập




Cổng khu chăn nuôi



Sử dụng bảo hộ lao động và sát trùng trước khi vào khu vực chăn nuôi



- ✿ Không cho khách tham quan chuồng, trại.
- ✿ Sử dụng quần áo, ủng, bảo hộ lao động riêng cho khu vực chăn nuôi, vệ sinh sát trùng quần áo, dụng cụ bảo hộ sau khi sử dụng.
- ✿ Diệt chuột và côn trùng gây hại. Ngăn chặn chim, động vật hoang dã và thú nuôi khác vào khu vực chăn nuôi.



Tiêu diệt ruồi, chuột, ngăn chó, mèo... vào khu vực chăn nuôi

- ✿ Cung cấp nước sạch (nước máy hoặc nước giếng khoan qua lọc) dùng cho lợn.
- ✿ Thức ăn hoặc nguyên liệu thức ăn đảm bảo chất lượng, không nhiễm các loại mầm bệnh.
- ✿ Kiểm soát nguồn thức ăn cho lợn ăn: Không cho lợn ăn thức ăn thừa của người khi chưa được nấu chín.